

## 目次

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| 1. 胃がん 術後 S-1 療法（716012） .....       | 2 |
| 2. 胃がん 術後 XELOX 療法（716006） .....     | 3 |
| 3. 胃がん 術後 S-1+ドセタキセル療法（716019） ..... | 4 |

初版 2020年12月04日

第2版 2021年3月3日

作成 羽生総合病院 外来化学療法センター/薬剤科

1. 胃がん 術後 S-1 療法 (716012)

| 薬品名  | 略語  | 1日投与量               | 投与方法 | 投与時間 | 投与日     | 備考                 |
|------|-----|---------------------|------|------|---------|--------------------|
| エスワン | S-1 | 80mg/m <sup>2</sup> | 食後   | 分2   | Day1-28 | Ccr<30の場合、<br>投与不可 |

■ 1コース期間：42日毎、総コース数：8コース（1年間）

- ・ T3（SS）N0とT1を除くStageⅡ/Ⅲを補助化学療法の対象とする。
- ・ 手術からの回復を待って、術後6週間以内にS-1投与を開始する。
- ・ 非手術例に比べ術後投与では血液毒性・非血液毒性とも出現しやすいので、臨床・血液所見に応じて薬剤投与レベルを下げるか、投与スケジュールを2週間投与1週間休薬に変更するなどの対応を行う。

■ 参考文献：[N Engl J Med.357\(18\):1810-20\(2007\)](#). (ACTS-GC 試験)

■ 催吐リスク：最小

■ 発熱性好中球減少リスク：低

■ 主な有害事象

S-1：悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着、流涙

■ 減量基準

|       | S-1    |        |        |
|-------|--------|--------|--------|
|       | 60mg/回 | 50mg/回 | 40mg/回 |
| 1段階減量 | 50mg/回 | 40mg/回 | 休薬     |
| 2段階減量 | 40mg/回 | 休薬     |        |

2. 胃がん 術後 XELOX療法 (716006)

| 薬品名         | 略語    | 1日投与量                  | 投与方法 | 投与時間 | 投与日        | 備考                      |
|-------------|-------|------------------------|------|------|------------|-------------------------|
| オキサリプラチン    | L-OHP | 130mg/m <sup>2</sup>   | 点滴静注 | 120分 | Day1       |                         |
| カペシタビン [C法] | Cape  | 2,000mg/m <sup>2</sup> | 食後   | 分2   | Day1 夕-15朝 | Ccr < 30mL/min の場合、投与不可 |

■ 1コース期間：21日毎、総コース数：8コース

■ 参考文献：[Lancet.379\(9813\):315-21\(2012\).](#) (CLASSIC試験) [N Engl J Med.358\(1\):36-46\(2008\).](#)

■ 催吐リスク：中

■ 発熱性好中球減少リスク：低

■ 血管への影響：L-OHP：炎症性抗がん剤

■ 主な有害事象

- ・ Cape：悪心、食欲不振、下痢、口内炎、手足症候群、骨髄抑制
- ・ L-OHP：悪心、嘔吐、末梢神経障害、感覚異常、疲労、アレルギー反応

■ 減量基準

|       | Cape                   | L-OHP                |
|-------|------------------------|----------------------|
| 1段階減量 | 1,600mg/m <sup>2</sup> | 100mg/m <sup>2</sup> |
| 2段階減量 | 1,200mg/m <sup>2</sup> | 85mg/m <sup>2</sup>  |

\*カペシタビン (C法)：体表面積別減量基準

| Cape：C法 | <1.41 m <sup>2</sup> | 1.41-1.51 m <sup>2</sup> | 1.51-1.81 m <sup>2</sup> | 1.81-2.11 m <sup>2</sup> | >2.11 m <sup>2</sup> |
|---------|----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1段階減量   | 900mg/回              | 1,200mg/回                |                          | 1,500mg/回                |                      |
| 2段階減量   | 600mg/回              |                          | 900mg/回                  |                          | 1,200mg/回            |

3. 胃がん 術後 S-1+ドセタキセル療法（716019）

| 薬品名    | 略語  | 1日投与量               | 投与方法 | 投与時間 | 投与日     | 備考     |
|--------|-----|---------------------|------|------|---------|--------|
| エスワン   | S-1 | 80mg/m <sup>2</sup> | 食後   | 分2   | Day1-14 | 1-7コース |
| ドセタキセル | DTX | 40mg/m <sup>2</sup> | 点滴静注 | 60分  | Day1    | 2-7コース |

|      |     |                     |    |    |         |        |
|------|-----|---------------------|----|----|---------|--------|
| エスワン | S-1 | 80mg/m <sup>2</sup> | 食後 | 分2 | Day1-28 | 8コース以降 |
|------|-----|---------------------|----|----|---------|--------|

■1コース期間：【1-7コース】21日毎、【8コース以降】42日毎、総コース数：（1年間）

・ D2以上のリンパ郭清を伴うR0切除術を施行したstageⅢ胃がん

■参考文献：J Clin Oncol. 37(15):1296-1304(2019).（JACCRO GC-07試験）

■催吐リスク：低

■発熱性好中球減少リスク：低

■血管への影響：DTX：起壊死性抗がん剤

■主な有害事象

・ S-1：悪心、嘔吐、食欲不振、下痢、口内炎、骨髄抑制、倦怠感、色素沈着、流涙

・ DTX：骨髄抑制、悪心、嘔吐、脱毛、倦怠感、末梢神経障害、皮疹、爪の変化、感染、浮腫・胸水・体液貯留（300～400mg/m<sup>2</sup>以上）

■減量基準

|       | S-1    |        |        | DTX                 |
|-------|--------|--------|--------|---------------------|
|       | 60mg/回 | 50mg/回 | 40mg/回 |                     |
| 1段階減量 | 50mg/回 | 40mg/回 | 休薬     | 35mg/m <sup>2</sup> |
| 2段階減量 | 40mg/回 | 休薬     |        | 30mg/m <sup>2</sup> |